

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP -9-6-66 514954

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Avertissements Agricoles d'ARRAS.  
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

15 F  
N° LXIX

- 6 JUIN 1966 -

## AVERTISSEMENTS

## MILDIOU

## POMMES DE TERRE

Les dernières conditions climatiques n'ont guère été favorables au champignon. Cependant, quelques rares foyers ont pu être observés à la fin-mai.

D'ailleurs, l'expérience des années passées nous incite à croire que la garantie totale des récoltes ne peut être obtenue qu'à la condition d'empêcher toute implantation précoce du mildiou même si cette implantation apparaît au départ comme insignifiante. Et ce résultat ne peut être obtenu qu'au prix de traitements préventifs soignés qui peuvent se révéler par la suite superflus si l'été est sec mais qui se montrent très efficaces si l'été est pluvieux.

En conséquence, les agriculteurs qui ne veulent prendre aucun risque effectueront une pulvérisation préventive du 7 au 10 juin sur toutes les cultures levées avant le début-mai, (plantations de fin-mars et de la 1ère quinzaine d'avril). Le traitement pourra être étendu aux cultures plus tardives si celles-ci se trouvent à proximité immédiate de tas de déchets ou de cultures plus avancées contaminées par le mildiou ou dans des situations particulièrement sensibles. Pour les variétés féculières et les cultures tardives assez isolées et bien aérées, attendre un avis ultérieur.

## TAVELURES DES FRUITS A PEPINS

## CULTURES FRUITIERES

Les contaminations primaires ont été très virulentes cette année et des taches existent dans de nombreux vergers. Dans ces vergers, il convient donc d'assurer une protection assez continue jusqu'à la récolte en adoptant une cadence de traitement de l'ordre de 15 jours.

REMARQUES - OIDIUM DU POMMIER - Les contaminations sont très virulentes en ce moment. Ajouter systématiquement un produit anti-oïdium à chaque intervention et prévoir lors des périodes chaudes des traitements spéciaux intercalaires. Dans les vergers très contaminés, il convient même d'effectuer plusieurs pulvérisations soignées à intervalles très rapprochés (5 jours).

PUCERONS - ACARIENS - Si cela n'a déjà été fait, profiter d'une période de végétation active pour effectuer le traitement avec un produit systémique.

## INFORMATIONS

## CECIDOMYIE DES FLEURS DU POIS

(valable uniquement pour les Flandres et la vallée de la Lys)

Le vol est important. Il faut protéger les pois de conserverie et les pois de casserie. Le 1er traitement doit intervenir juste avant la floraison et le 2ème traitement 10 jours après.

Sur pois très fleuris, utiliser un produit autorisé (endosulfan, phosalone, par exemple). Sur pois n'ayant pas dépassé le tout début de floraison, on peut également employer le DDT ou un produit du même type.

RAPPEL - PUCERONS DE LA BETTERAVE : URGENT (voir avis de l'I.T.B.)

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

R. DIVOUX

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

P. COUTURIER